

ORNITHOLOGISCH VERSLAG 1966

Alle activiteiten werden uitgevoerd onder Vogelvergunning F van het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming inhoudende vrijstelling van de artikelen 5 en 7 van de Vogelwet 1936,

Het onderzoek werd gerealiseerd op terreinen waarvoor door de recht- hebbenden toestemming aan ondergetekende was verleend .

De gehele administratie wordt centraal uitgevoerd door het Vogeltrek- station te Arnhem, waarbij alle vergunninghouders zijn aangesloten.

De Werkzaamheden bestonden uit :

- a. Ringen van nest jongen
- b. Ringen van trekvogels op vinkenbaan
- c. Onderzoek naar speciale vogelsoorten d Waarnemingen

De ringplaatsen waren in hoofdzaak Voorschoten, enkele buitenplaatsen te Wassenaar, terwijl ca. 80% van het onderzoek plaats vond in het duingebied van Staatsbosbeheer.

Het onderzoek strekte zich uit over het gehele jaar 1966 met als topmaanden mei/ juni voor de nest jongen en september/oktober voor de trekvogels; in oktober was de baan bezet gedurende de hele ochtend in de weekends, en bij gunstig weer ook op de andere dagen tussen 7.30 uur en 10.00 uur.

De trekvogels werden gevangen met grote slagnetten en deels met mist netten, terwijl een niet onaanzienlijk aantal vogels werd geringd met behulp van een Steenuil.

Bij alle activiteiten werd ondergetekende op prettige, actieve en kundige wijze geassisteerd door de studenten:

- G. van Tol te Wassenaar
J. van Alphen te Voorschoten

Deze jonge mannen zijn door hun enthousiasme sinds jaren uitstekende vogelkenners geworden en hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de resultaten.

Het totaal der geringde vogels, gesplitst naar nest jongen, en vol- wassen exemplaren wordt als volgt vermeld :

	Pull.	Volgr.	Totaal
Vink	9	664	673
Keep		154	154
Groenvink	10	76	86
Kneu	37	37	74
Sijs		138	138
Kl. Barmsijs		4	4
Gr. Barmsijs		3	3
Frater		58	58
Putter		23	23
Goudvink	3		3
Ringmus		141	141
Rietgors		25	25
Geelgors		1	1
Kruisbek		10	10
Nachtegaal	28	3	31
Roodborst	18	40	58
Gekr. Roodstaart	6	13	19
Zwarte Roodstaart		3	3

	Pull.	Volgr.	Totaal
Tapuit	42	3	45
Roodborsttapuit	102	2	104
Paapje	40		40
Heggemus	22	70	92
Grasmus	7	3	10
Zwartkop	7	5	12
Tuinfluitier	14		14
Braamsluiper	10	1	11
Fitis	109	28	137
Tjiftjaf	20	13	33
Sprinkhaanrietzanger	1		1
Gr. Vliegenvanger	11		11
Winterkoning	26	6	32
Boomkruiper		4	4
Boomklever		35	35
Startmees	36	3	39
Koolmees		155	155
Pimpel		38	38
Zwarte mees		9	9
Kuifmees		3	3
Glanskopmees		11	11
Matkopmees		1	1
Goudhaantje		2	2
Boerenwaluw	148		148
Graspieper	4	37	41
Boompieper	8	1	9
Witte Kwikstaart	16	4	20
Veldleeuwerik	8	5	13
Boomleeuwerik	5		5
Merel		30	30
Zanglijster	84	8	92
Grote Lijster		2	2
Koperwiek		1	1
Kramsvogel		1	1
Spreeuw		10	10
Kievit	1		1
Grutto	2		2
Koekoek	1		1
Sperwer		3	3
Torenvalk	4		4
Blauwe kiekendief		1	1
Kauw		1	1
	839	1889	2728

Aantal soorten: 60

Het ligt in de bedoeling om voor 1967 de geringde exemplaren bader te verdelen in vogels geringd in het duingebied van Staatsbosbeheer en elders, en verder een splitsing te maken in vogels die gevangen zijn, resp. met slagnetten en mistnetten.

Het is voorts het plan in 1967 een inventarisatie te maken van de broedparen in het Staatsbosgebied. Ook zullen onder supervisie en in samenwerking met Staatsbosbeheer nestkasten worden aangebracht, en deze zullen in het onderzoek worden opgenomen; geadviseerd zal worden nestkasten aan te brengen voor Mezen e.d. Vliegenvangers, Spechten en Uilen.

BROEDVOGELS :

De volgende soorten werden in het Staatsbosgebied als broedvogels vastgesteld :
 Fitis - Tjiftjaf - Grasmus - Braamsluiper - Nachtegaal - Heggemus
 Roodborst - Winterkoning - Gekraagde Roodstaart - Bosrietzanger

Sprinkhaanrietzanger - Witte Kwikstaart - Merel - Zanglijster - Grote lijster - Koolmees - Pimpelmees - Staartmees - Tapuit - Paapje - Roodborsttapuit - Boerenzwaluw - Oeverzwaluw - Vink - Kneu - Rietgors - Grote bonte Specht - Groene Specht - Bostortel - Turkse ~~Specht~~ tortel - Houtduif - Koekoek - Vlaamse gaai - Steenuil - Ransuil - Bosuil - Veldleeuwerik - Boomleeuwerik - Boompieper - Wilde eend
Slobeend - Wintertaling - Zomertaling - Kuifeend - Bergeend - Dodaars - Tafeleend - Waterhoen - Meerkoet - Waterral - Watersnip - Kievit - Tureluur - Wulp - Kleine plevier - Patrijs en Fazant .

WAARNEMINGEN :

AIS Interessant kunnen O.a. de Volgende soorten worden doorgegeven:

Zwarte mees - Kuifmees - Goudhaantje - Sneeuwgorst - IJsgors - Ortolaan - Kuifduiker - Waterspreeuw - Grote gele Kwikstaart - KuifAalscholver - Visarend - Zeearend - Zwarte Ooievaar - Buizerd

VREEMDE VANGSTEN:

De nummers van de betreffende vogels werden aan de Ringcentrale doorgegeven.

EIGEN VANGSTEN:

Ook hiervan werd een aantal exemplaren teruggevangen; enkele werden reeds in 1962 geringd.

TERUGMELDINGEN :

Hiervan is vermeldenswaard een Sperwer, geringd de Vinkenbaan, die reeds 5 dagen later uit België werd teruggemeld, geschoten. (zijn onze roofvogels internationaal niet beter te beschermen?)

SPECIALE ONDERZOEKEN:

BOOMKLEVERS :

Dit betreft het nagaan van verplaatsing van deze soort; reeds enkele jaren worden in de maanden januari en februari de Klevers op dezelfde plaatsen geringd. Een overzicht van de resultaten is gepubliceerd in het kontaktorgaan van de Nederlandse ringers; het onderzoek wordt in 1967 voortgezet.

ROODBORSTTAPUIT :

Van deze interessante duinvogel werden veel waarnemingen gedaan en een groot aantal nest jongen geringd; de Roodborsttapuit broedt overwegend in het vrije duin en dermate beschermd dat praktisch geen nest verloren gaat; slechts in twee gevallen, mij bekend, werd het broedsel verstoord, maar de Wezels waren hier debet aan. De Roodborsttapuit broedt tweemaal snel achter elkaar en in bijna alle gevallen werd het tweede broedsel gevonden op nog geen 20 meter afstand van het eerste; onderzocht moet nog worden of in sommige gevallen een derde broedsel wordt groot gebracht; het aantal jongen bedroeg steeds 5 à 6 per nest en alle nesten werden gevonden op droog terrein in tegenstelling tot de nesten van het verwante Paapje die zonder uitzondering bij de duinmeertjes werden gevonden.

Het ligt in de bedoeling om in 1967 te proberen een aantal volwassen exemplaren te vangen bij voorkeur geringde vogels, teneinde het onderzoek meer achtergrond te geven.

De nesten van de tapuit werden zonder uitzondering gevonden in Konijnepijpen.

Vermeldenswaard is dat een reeds bebroed Koekoeksei door een Paapje werd uitgeworpen, waardoor het betreffende broedsel voorspoedig uitvloog; in een nest van een Paapje op korte afstand echter, werden drie dode jongen aangetroffen van ca. 6 dagen en bij onderzoek bleek dat zich daarin een jonge Koekoek bevond van twee dagen die nog kans had gezien de veel grotere jongen naar buiten te werpen; de twee overlevende jonge Paapjes werden bij soortgenoten ondergebracht en kwamen voorspoedig uit, hetgeen ook met de Koekoek het geval was.

Bovenstaande zeer beperkte gegevens kunnen duidelijk maken dat het aan Flora en Fauna rijke duingebied van het Staatsbosbeheer, inkl het Waterwingebied, zich bijzonder goed leent voor een intensief onderzoek.

Tot slot wil ik gaarne dank zeggen voor de vele medewerking die ik heb ondervonden bij de uitvoering van het onderzoek en met name geldt dit- voor de prettige medewerking van de autoriteiten van Staatsbosbeheer, de Gemeentepolitie te Wassenaar en de Rijkspolitie te Voorschoten.

Voorschoten, ' januari 1967.

de Beer.